

ΘΕΜΑ Α

- A1. Αν x_1, x_2, \dots, x_k είναι οι τιμές μίας μεταβλητής X που αφορά άτομα ενός δείγματος μεγέθους n , $k \leq n$, να αποδείξετε ότι για τις αντίστοιχες σχετικές συχνότητες f_i ισχύει ότι:

$$f_1 + f_2 + \dots + f_k = 1.$$

Μονάδες 6

- A2. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως **Σωστές** ή **Λανθασμένες**:

- (α) Το ραβδόγραμμα (barchart) χρησιμοποιείται για τη γραφική παράσταση των τιμών μίας ποσοτικής μεταβλητής.
- (β) Η διακύμανση/διασπορά μετριέται στις ίδιες μονάδες που μετριοούνται και οι παρατηρήσεις του δείγματος.
- (γ) Σε ένα δείγμα 5 παρατηρήσεων με μέση τιμή $\bar{x} = 6$ αν αυξήσουμε μία παρατήρηση κατά 2 μονάδες τότε θα αυξηθεί και η μέση τιμή κατά 2 μονάδες.
- (δ) Η διάμεσος ενός δείγματος είναι πάντοτε ίση με μία από τις παρατηρήσεις του δείγματος.
- (ε) Το εύρος (R) ενός δείγματος μας δείχνει την απόσταση της μεγαλύτερης από την μικρότερη παρατήρηση.

Μονάδες 10

- A3. Ποιες μεταβλητές ονομάζουμε **ποσοτικές** και σε ποιες κατηγορίες τις διακρίνουμε; Να δώσετε από τρία παραδείγματα για κάθε κατηγορία που θα γράψετε.

Μονάδες 6

- A4. Να χαρακτηρίσετε την ακόλουθη πρόταση ως **Σωστή** ή **Λανθασμένη** και να **αιτιολογήσετε** την απάντησή σας:

«Αν οι 400 παρατηρήσεις ενός δείγματος ακολουθούν περίπου κανονική κατανομή με μέση τιμή $\bar{x} = 46$ και τυπική απόκλιση $s = 4$ τότε περίπου 480 από αυτές είναι μικρότερες ή ίσες από 54».

Μονάδες 3

ΛΥΣΗ

- A1. Σ.Β., σελ. 65.

- A2. (α') Λάθος
(β') Λάθος
(γ') Λάθος
(δ') Λάθος

(ε') Σωστό

A3. Σ.Β., σελ. 59.

A4. Η πρόταση είναι **Λανθασμένη**. Πράγματι, αφού οι παρατηρήσεις ακολουθούν περίπου κανονική κατανομή με μέση τιμή $\bar{x} = 46$ και τυπική απόκλιση $s = 4$ τότε το 2,5% αυτών είναι μεγαλύτερες από $\bar{x} + 2s = 46 + 8 = 54$, συνεπώς περίπου $400 \cdot 2.5\% = 400 \cdot \frac{2.5}{100} = 10$ παρατηρήσεις είναι μεγαλύτερες από 54 άρα οι υπόλοιπες (περίπου) 490 είναι μικρότερες ή ίσες από 54.

ΘΕΜΑ Β

Οι θερμοκρασίες των τελευταίων 10 ημερών στην πόλη της Χαλκίδας ήταν οι εξής:

27, 24, 27, 27, 26, 25, 24, 25, 28, 27.

B1. Να κατασκευάσετε έναν πίνακα συχνοτήτων για το παραπάνω δείγμα που να συμπεριλαμβάνει τις απόλυτες (v_i) και σχετικές (f_i) συχνότητες καθώς και τις αντίστοιχες αθροιστικές συχνότητες.

Μονάδες 8

B2. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα και πολύγωνα σχετικών και αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων για το παραπάνω δείγμα.

Μονάδες 5

B3. Να υπολογίσετε τη μέση και τη διάμεση θερμοκρασία καθώς και την τυπική απόκλιση για το παραπάνω δεκαήμερο.

Μονάδες 9

B4. Να εξετάσετε αν το παραπάνω δείγμα είναι ομοιογενές.

Μονάδες 3

Δίνεται: $\sqrt{1.8} = 1.34$.

ΛΥΣΗ

B1. Στον πίνακα 1 βλέπουμε τον ζητούμενο πίνακα συχνοτήτων.


x_i	v_i	f_i	N_i	F_i
24	2	0.2	2	0.2
25	2	0.2	4	0.4
26	1	0.1	5	0.5
27	4	0.4	9	0.9
28	1	0.1	10	1
Σύνολο	10	1	—	—

Πίνακας 1: Ο πίνακας συχνοτήτων του ερωτήματος 2.

B2. Τα ζητούμενα διαγράμματα και πολύγωνα φαίνονται στο σχήμα 2

B3. Για τη διάμεσο, παρατηρούμε ότι οι δύο μεσαίες παρατηρήσεις είναι οι 26 και 27, επομένως:

$$\delta = \frac{26 + 27}{2} = 26.5.$$



(α') Διάγραμμα και **πολύγωνο** σχετικών συχνοτήτων.

(β') Διάγραμμα και **πολύγωνο** σχετικών συχνοτήτων.

Σχήμα 2: Διαγράμματα και πολύγωνα συχνοτήτων.

Για τη μέση τιμή έχουμε:

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 24 + 2 \cdot 25 + 1 \cdot 26 + 4 \cdot 27 + 1 \cdot 28}{10} = \frac{260}{10} = 26.$$

Για τη διακύμανση έχουμε:

$$s^2 = \frac{2(24 - 26)^2 + 2(25 - 26)^2 + 1(26 - 26)^2 + 4(27 - 26)^2 + 1(28 - 26)^2}{10} = \frac{2 \cdot 4 + 2 \cdot 1 + 0 + 4 \cdot 1 + 1 \cdot 4}{10} = \frac{18}{10} = 1.8.$$

Συνεπώς:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{1.8} = 1.34.$$

B4. Για την ομοιογένεια του δείγματος έχουμε:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{1.34}{26} < \frac{2.6}{26} = 0.1,$$

άρα το δείγμα είναι ομοιογενές.

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας συχνοτήτων για ένα δείγμα n παρατηρήσεων:

$[\alpha_i, \beta_i)$	x_i	ν_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
$[-4,0)$		4					
$[0,4)$			0,25				
$[4,8)$							90
$[8,12)$		2					
Σύνολο	—				—	—	—

Γ1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα.

Μονάδες 9

Γ2. Να βρείτε τη διάμεσο (δ) του δείγματος.

Μονάδες 8

Γ3. Έστω \bar{x} και s η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση του παραπάνω δείγματος αντίστοιχα. Αν \bar{x}' και s' είναι η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση του δείγματος αφού πολλαπλασιάσουμε κάθε παρατήρησή του με -4 , να λύσετε την εξίσωση:

$$x^2 - \frac{s' - s}{s}x - \frac{4\bar{x} - \bar{x}'}{\bar{x}'} = 0.$$

Μονάδες 8

ΛΥΣΗ

Γ1. Ο ζητούμενος πίνακας συχνοτήτων είναι πίνακας 2.

$[\alpha_i, \beta_i)$	x_i	ν_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
$[-4,0)$	-2	4	0.20	20	4	0.20	20
$[0,4)$	2	5	0.25	25	9	0.45	45
$[4,8)$	6	9	0.45	45	18	0.90	90
$[8,12)$	10	2	0.10	10	20	1	100
Σύνολο	—	20	1	100	—	—	—

Πίνακας 2: Ο ζητούμενος πίνακας συχνοτήτων.

Γ2. Για να βρούμε τη διάμεσο θα σχεδιάσουμε πρώτα το πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων επί τοις εκατό ($F_i\%$) όπως φαίνεται στο σχήμα 3. Στη συνέχεια, αφού η διάμεσος αντιστοιχεί στην τιμή $F_i = 50\%$ φέρουμε ευθεία από το 50 του άξονα των $F_i\%$ και κατασκευάζουμε τα σημεία A, B όπως φαίνεται στο σχήμα 3. Από την ομοιότητα των τριγώνων $\triangle ABC$ και $\triangle CDE$ έχουμε:

$$\frac{AB}{ED} = \frac{BC}{CD} \Leftrightarrow \frac{8 - \delta}{8 - 4} = \frac{90 - 50}{90 - 45} \Leftrightarrow \frac{8 - \delta}{4} = \frac{40}{45} \Leftrightarrow \frac{8 - \delta}{4} = \frac{8}{9} \Leftrightarrow 72 - 9\delta = 32 \Leftrightarrow \delta = \frac{40}{9}.$$

Γ3. Αφού πολλαπλασιάσουμε κάθε τιμή του δείγματος με -4 η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση μεταβάλλονται ως εξής:

$$\bar{x}' = 4\bar{x}, \quad s' = |-4|s = 4s.$$


Έτσι, έχουμε:

$$\frac{s' - s}{s} = \frac{4s - s}{s} = \frac{3s}{s} = 3 \quad (1)$$

$$\frac{4\bar{x} - \bar{x}'}{\bar{x}'} = \frac{4\bar{x} + 4\bar{x}}{-4\bar{x}} = \frac{8\bar{x}}{-4\bar{x}} = -2 \quad (2)$$

Αντικαθιστώντας τις (1) και (2) στη δοσμένη εξίσωση έχουμε:

$$x^2 - 3x - (-2) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \xrightarrow{\Delta=1>0} x = 1 \text{ ή } x = 2.$$



Σχήμα 3: Ιστόγραμμα και **πολύγωνο** $F_i\%$.

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται το παρακάτω δείγμα:

$$2, 4, 3, a, 0,$$

όπου $a \in \mathbb{R}$.

Δ1. Να βρείτε την τιμή του a για την οποία για τη μέση τιμή (\bar{x}) του δείγματος ισχύει $\bar{x} = 3$.

Μονάδες 4

Δ2. Να βρείτε τις τιμές του a για τις οποίες για τη διάμεσο (δ) του δείγματος ισχύει $\delta = 3$.

Μονάδες 5

Δ3. Να βρείτε τις τιμές του a για τις οποίες $\bar{x} = \delta$.

Μονάδες 7

Δ4. Για $a = 6$:

(α') Να δείξετε ότι το δείγμα είναι ανομοιογενές.

Μονάδες 2

(β') Να βρείτε την ελάχιστη τιμή της θετικής σταθεράς c που πρέπει να προσθέσουμε σε κάθε παρατήρηση έτσι ώστε το δείγμα να γίνει ομοιογενές.

Μονάδες 7

ΛΥΣΗ

Δ1. Έχουμε:

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 3 + a + 0}{5} = \frac{9 + a}{5},$$

επομένως:

$$\bar{x} = 3 \Leftrightarrow \frac{9 + a}{5} = 3 \Leftrightarrow 9 + a = 15 \Leftrightarrow a = 6.$$

Δ2. Διατάσσουμε τις γνωστές παρατηρήσεις σε αύξουσα σειρά:

$$0, 2, 3, 4.$$

Δεδομένου ότι οι παρατηρήσεις μας είναι 5 στο πλήθος, η διάμεσος θα είναι μία από αυτές. Έτσι, για να ισχύει ότι η διάμεσος είναι ίση με 3 πρέπει είτε $a > 3$, οπότε η μεσαία παρατήρηση είναι το 3 είτε $a = 3$ οπότε και πάλι η μεσαία παρατήρηση είναι το 3. Ειδικά, αν δηλαδή $a < 3$ τότε η μεσαία παρατήρηση είναι το a , άρα $\delta = a < 3$. Συνεπώς, οι ζητούμενες τιμές είναι $a \geq 3$.

Δ3. Όπως είδαμε παραπάνω:

$$\delta = \begin{cases} 3 & a \geq 3 \\ a & a < 3 \end{cases}$$

Διακρίνουμε, λοιπόν, δύο περιπτώσεις:

- Αν $a \geq 3$ τότε:

$$\bar{x} = \delta \Leftrightarrow \frac{9 + a}{5} = 3 \Leftrightarrow 9 + a = 15 \Leftrightarrow a = 6,$$

που είναι δεκτό.

- Αν $a < 3$ τότε:

$$\bar{x} = \delta \Leftrightarrow \frac{9 + a}{5} = a \Leftrightarrow 9 + a = 5a \Leftrightarrow 4a = 9 \Leftrightarrow a = \frac{9}{4},$$

που είναι δεκτό γιατί $\frac{9}{4} < 3$.

Συνεπώς, οι ζητούμενες τιμές είναι $a = 6$ και $a = \frac{9}{4}$.

Δ4. Για $a = 6$:

(α') Έχουμε $\bar{x} = 3$ όπως είδαμε παραπάνω, ενώ για τη διακύμανση έχουμε:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{(0 - 3)^2 + (2 - 3)^2 + (3 - 3)^2 + (4 - 3)^2 + (6 - 3)^2}{5} = \\ &= \frac{9 + 1 + 0 + 1 + 9}{5} = \\ &= 4. \end{aligned}$$

Συνεπώς $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{4} = 2$ άρα:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{2}{3} > 0.1,$$

άρα το δείγμα είναι ανομοιογενές.

(β') Αν προσθέσουμε σε κάθε παρατήρηση μία θετική σταθερά c τότε η νέα μέση τιμή \bar{x}' θα είναι $\bar{x}' = \bar{x} + c = 3 + c$ ενώ η τυπική απόκλιση θα παραμείνει αμετάβλητη. Συνεπώς:

$$CV' = \frac{s'}{\bar{x}'} = \frac{2}{3+c}.$$

Για να είναι το δείγμα μας ομοιογενές πρέπει:

$$CV' \leq 0.1 \Leftrightarrow \frac{2}{3+c} \leq \frac{1}{10} \stackrel{c>0}{\Leftrightarrow} 20 \leq 3+c \Leftrightarrow c \geq 7.$$

Έτσι, η ελάχιστη τιμή για την οποία συμβαίνει αυτό είναι $c = 7$.